AS MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS DA REGIÃO DE MARA ROSA (GO)

HOMERO LACERDA*

ABSTRACT In Mara Rosa region there is a number of gold mineralized areas that are being mined by prospectors. The main purpose of this work is to describe each mineralized area in order to define types and controls of gold mineralization. A generalized model for gold metallogenesis in the area is also proposed. The stratigraphy of the area comprises: Mara Rosa Supracrustals and Granite-Gneiss Complex, both of Archean to Early Proterozoic Age; Tertiary/Quaternary Lateritic Cover; and Quaternary Alluvial Deposits. Nine of the 14 gold occurrences studied are stratabound and occur in Mara Rosa Supracrustals; two are vein and pipe like quartz bodies in Mara Rosa Supracrustals and Granite-Gneiss Complex; and three are alluvial gold deposits overlying Mara Rosa Supracrustals. Although gold placer deposits have not been studied here, they have been mined in the area. It is proposed that syngenetic and low-grade gold mineralization are associated with interflow graphitic sediments, intermediate tuffs, and chert belonging to Mara Rosa Supracrustals. Folding and metamorphism resulted in local enrichments inside these source beds originating stratabound gold mineralization. Epigenetic and structurally controlled vein and pipe like ore bodies originated at least in part by remobilization of pre-existing syngenetic mineralization. Alluvial gold mineralization was originated by weathering of weakly mineralized Mara Rosa Supracrustals rocks, whereas alluvial placer deposits were originated by reworking of all three pre-existing mineralization types. The studied area illustrates the permanence of gold mineralization in a given area by successive reworking of an early gold concentration both by endogenous and exogenic processes. In fact, a NNE trending belt contains most of known gold mineralization of the area.

INTRODUÇÃO A exploração de ouro na região de Mara Rosa, situada na porção central do Estado de Goiás (Fig. 1), remonta ao período colonial, quando a lavra de aluviões auríferas deu origem ao povoado de Amaro Leite. A atividade garimpeira na área iniciou-se por volta de 1980 e no final de 1983, no auge, ali trabalhavam cerca de 500 pessoas distribuídas em 14 garimpos. A partir de dados oficiais sobre comercialização de ouro na região e de dados sobre a evolução das atividades de garimpagem na área (Machado *et al.* 1980, Machado *et al.* 1981, Campos *et al.* 1985), estima-se uma produção da ordem de 200 kg de ouro para o período de 1980 a 1984.

Esta nota tem por objetivo contribuir para o conhecimento geológico das mineralizações auríferas da região, pela descrição das frentes de garimpagem. A posição das mineralizações no contexto geológico regional foi abordada pela compilação de um mapa geológico em escala 1:100.000, apoiada na realização de perfis geológicos regionais, no qual foram plotadas as ocorrências descritas. As áreas com maiores concentrações de garimpos foram mapeadas em escala 1:50.000 ou 1:25.000 visando a definição do contexto geológico local das mineralizações. Alguns garimpos foram mapeados em escala 1:2.000 com objetivo de definir a morfologia dos corpos mineralizados e suas relações espaciais com as rochas encaixantes. Esses trabalhos foram complementados pela observação de seções delgadas e polidas, estas últimas tanto de rocha como de concentrações de minerais pesados.

A figura 1 ilustra, esquematicamente, o contexto geológico regional da área estudada, que será descrito a seguir.

O Complexo Granito-Gnáissico (Danni & Fuck 1981, Marini *et al.* 1984) é constituído por ortognaisses graníticos, tonalíticos e granodioríticos, em meio aos quais ocorrem núcleos granito-granodioríticos. Neste complexo observam-se faixas miloníticas balizando lineamentos estru-

turais de direção N20-40 E, além de feições migmatíticas subordinadas. Esta unidade apresenta evolução policíclica, do Arqueano ao Proterozóico Superior, e nela estariam englobados terrenos que serviram de substrato para os *greenstone belts* arqueanos, assim como terrenos gerados durante a evolução pós-*greenstone belts* da região.

Os *greenstone belts* ocorrem na região de Crixás-Pilar de Goiás (Fig. 1), sob a forma de calhas encaixadas no Complexo Granito-Gnáissico (Danni & Ribeiro 1978, Sabóia 1979). Na área de Crixás, o *greenstone belt* é constituído por três unidades (Sabóia 1979, Sabóia *et al.* 1981): basal, constituída essencialmente de rochas metavulcânicas ultramáficas; média, constituída essencialmente por rochas metavulcânicas máficas; e de topo, essencialmente metasedimentar pelítica e química. Se existe consenso em considerar esta sequência como um *greenstone belt* arqueano, o mesmo não ocorre em relação à sequência vulcano-sedimentar que aflora na região de Mara Rosa (Fig. 1). Machado *et al.* (1981) e Machado (1981) consideram-na como sendo o prolongamento do *greenstone belt* de Crixás-Pilar de Goiás enquanto Ribeiro Filho (1981) acredita tratar-se de uma sequência vulcano-sedimentar de idade proterozóica inferior.

O Grupo Araxá, de idade proterozóica média, é constituído essencialmente de mica xistos, aos quais se associam quartzitos próximo à base de cálcio-xistos e mármore em direção ao topo.

GEOLOGIA A estruturação da área estudada obedece a um rumo NE, com alternância de faixas vulcano-sedimentares (Sequência Mara Rosa) e faixas granitóides (Complexo Granito-Gnáissico), ambas parcialmente recobertas por lateritas (Fig. 2).

* Departamento Nacional da Produção Mineral, VI Distrito Regional. Rua 84, n.º 593, Setor Sul, CEP 74000, Goiânia, GO, Brasil

Figura 1 - Contexto geológico regional da área estudada (modificado de Machado 1981)

Estratigrafia Segue-se a descrição sumária das unidades estratigráficas da área, da base para o topo, segundo o modelo estratigráfico aqui adotado.

SEQUÊNCIA MARA ROSA Ribeiro Filho (1981) propôs a denominação informal de Sequência Mara Rosa para as faixas vulcano-sedimentares que ocorrem na região estudada e que correspondem ao Conjunto Vulcano-Sedimentar de Machado *et al.* (1981). A idade dessas rochas é controversa e pode ser arqueana (Machado *et al.* 1981) ou proterozóica inferior (Ribeiro Filho 1981). De acordo com os litotipos predominantes a Sequência Mara Rosa pode ser dividida em:

- **Gnaisses e mica xistos:** São as unidades rochosas predominantes, estando representadas por biotita gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses, muscovita gnaisses, muscovita-biotita xistos, muscovita xistos, granada-muscovita-biotita xistos e, subordinadamente, mica xistos a cianita e/ou estauroilita.
- **Anfibolitos:** Estão representados por epídoto anfibolito, quartzo-epídoto anfibolito, plagioclásio anfibolito e clinopiroxênio anfibolito, contendo pequenas intercalações de xistos magnesianos, mais abundantes no canto noroeste da área.

COMPLEXO GRANITO-GNÁISSICO Este complexo é constituído por ortognaisses tonalíticos, granitos e milonitos de composição granítica (Fig. 2). Suas relações estratigráficas com a Sequência Mara Rosa são controversas (Ribeiro Filho 1981, Machado *et al.* 1981), mas a presença de xenólitos de rochas desta sequência nos granitóides daquele complexo sugere que ele seja mais recente.

Os ortognaisses tonalíticos têm granulação grossa, foliação concordante com a direção da Sequência Mara Rosa e contêm inclusões de anfibolito.

Os granitos têm granulação média a grossa e apresentam, geralmente, foliação incipiente, podendo, frequentemente, ser considerados como protomilonitos.

Machado *et al.* (1981) descrevem, nestas rochas, inclusões e restos de teto (*roof-pendants*) de gnaisses da Sequência Mara Rosa.

Milonitos de composição granítica, contendo intercalações de mica xistos com espessuras aparentes variando do metro a centenas de metros, ocorrem na porção SE da área estudada (Fig. 2). Os mica xistos são localmente grafitosos e contêm intercalações de quartzitos micáceos bandados e ortoanfibolitos, sendo interpretados como supracrustais pertencentes à Sequência Mara Rosa. Os milonitos podem representar supracrustais milonitizados ou granitóides milonitizados. Considera-se a segunda hipótese a mais provável, com base nas seguintes observações: existência, a NE e ao longo do mesmo rumo, de granitos milonitizados (protomilonitos) com inclusões e restos de teto (*roof-pendants*) de xistos e gnaisses, podendo representar a mesma unidade, porém menos deformada; presença, nos milonitos, de porfiroclastos de quartzo + feldspato com textura granular, podendo representar fragmentos de granito que sobreviveram ao processo de milonitização; e presença, dentro da Sequência Mara Rosa, de veios graníticos dobrados e apresentando uma foliação milonítica.

INTRUSIVAS MÁFICAS-ULTRAMÁFICAS Ocorrem em corpos de dimensões quilométricas (Fig. 2), intrusivos na Sequência Mara Rosa e nos ortognaisses tonalíticos do Complexo Granito-Gnáissico, sendo constituídos por gabro, hornblendito e diorito (Ribeiro Filho *et al.* 1978, Machado *et al.* 1981).

COBERTURAS TERCIÁRIO-QUATERNÁRIAS Estão representadas pela cobertura detritico-laterítica terciária-quaternária e pelas aluviões quaternárias.

Geologia estrutural Nas rochas da Sequência Mara Rosa a fase F_1 se manifesta por meio de dobras isoclinais deitadas, com espessamento apical, eixo N15W/20SW e plano axial N30W/30NW. Tais dobras são frequentemente intrafoliais e provocaram a transposição do acamamento (S_0) das supracrustais. A foliação plano-axial S_1 é uma xistosidade definida pela isorientação de biotita, muscovita e hornblenda. Porfiroblastos de granada são tardi a pós-tectônicos em relação a F_1 , enquanto os porfiroblastos de estauroilita e cianita são pós-tectônicos em relação a F_1 , indicando um metamorfismo na fácies anfibolito.

Nos ortognaisses tonalíticos do Complexo Granito-Gnáissico, a fase F_1 se manifesta através de dobras isoclinais, discerníveis graças à existência, nestas rochas, de zonas mais ricas em minerais máficos. Estas dobras têm seu plano axial marcado pela foliação dos ortognaisses, concordante com a foliação S_1 das rochas da Sequência Mara Rosa.

Feições miloníticas ocorrem, ocasionalmente, nas rochas da Sequência Mara Rosa e nos granitos e ortognaisses tonalíticos do Complexo Granito-Gnáissico. Nos contatos entre as duas unidades estas feições estão sempre presentes. São, obviamente, sempre bem marcadas nos milonitos de composição granítica. A foliação milonítica (S_m) é concordante com a foliação plano-axial S_1 , estando ambas deformadas pelas dobras da fase F_2 . A observação de biotita, muscovita e clorita sin-milonitização indica que esta deformação se deu na fácies xisto verde. Este evento de milonitização pode ser tardi- F_1 mas, na falta de evidências mais seguras, será considerado separadamente (F_m).

As dobras da fase F_2 são anisópacas, geralmente fechadas e, mais raramente, isoclinais. Elas deformam S_1 e S_m apresentando eixos com atitudes N20–40W/30NW. Mostram vergência para SE e são, portanto, praticamente co-axiais com as dobras F_1 . Nos litotipos mais ricos em mica, desenvolveu-se uma foliação plano-axial S_2 do tipo clivagem de crenulação, em cujos planos ocorrem muscovita e, mais raramente, biotita e clorita. As dobras desta fase foram observadas principalmente na porção SE da área, nos xistos da Sequência Mara Rosa e nos milonitos do Complexo Granito-Gnáissico. A esta fase de deformação parece corresponder um metamorfismo na fácies xisto verde que, juntamente com a milonitização acima referida, seria o responsável pelas frequentes feições de retrometamorfismo

observadas, tais como alteração da hornblenda em tremolita e clorita, da granada em biotita e clorita, da cianita em muscovita etc.

Seguem-se duas fases de dobramentos, representadas por dobras isópacas, fechadas, com eixos N50–70E/20SW (F_3) e dobras isópacas, suaves, com eixos N50–80W/40NW e planos axiais verticalizados (F_4), observadas na Sequência Mara Rosa e nos ortognaisses tonalíticos do Complexo Granito-Gnáissico. Os falhamentos mais importantes têm direção NE sendo cortados por falhas de direção NW. As falhas com direção NE são balizadas por veios de quartzo e, mais raramente, por brechas de esmagamento e representam reativações de antigas zonas de cisalhamento. Este fato é demonstrado pelo exame das brechas descritas

Figura 2 – Geologia da área estudada (compilado e modificado de Ribeiro Filho et al. 1978 e Machado et al. 1981)

por Ribeiro Filho *et al.* (1978), constituídas por fragmentos angulosos de milonito de composição granítica em matriz de granulação muito fina, sem orientação, constituída de argilomineral, quartzo, carbonato e feldspato. A presença dos fragmentos de milonito na brecha indica a superposição de deformações rúpteis, representadas por falhas balizadas por brechas de esmagamento, a deformações de natureza dúctil, representadas por zonas de cisalhamento balizadas por milonitos (Sá & Hackspacher 1982).

MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS Após uma revisão dos trabalhos anteriores sobre as mineralizações auríferas da região, serão descritas as ocorrências estudadas e designadas pelos nomes dos respectivos garimpos.

Trabalhos anteriores Machado *et al.* (1981) descreveram as mineralizações da área de Amaralina (Fig. 2) como estando relacionadas a um nível de *metachert* contendo segregações quartzosas e intercalações de rocha grafitosa. Segundo esses autores, a camada de *metachert* está intercalada em anfibólitos com teores anômalos de ouro e ocorre em zona de falha, o que teria propiciado a remobilização do ouro nas encaixantes e sua concentração local. Os mesmos autores descreveram vestígios de antigos trabalhos de mineração de ouro nos arredores do povoado de Amaro Leite (Fig. 2). Ali ocorreriam "xistos filonitizados que sofreram processos de metassomatismo (carbonatação e cloritização), dando origem a cálcio-clorita xistos, clorita-cálcio xistos e granada-biotita-plagioclásio xistos calcíferos", contendo disseminações de pirita e calcopirita. Segundo os autores citados, "os processos de metassomatismo talvez tenham sido os responsáveis ainda pela remobilização e concentração de minerais sulfetados, muito frequentes no local, e, quiçá, também do ouro". Ainda na área de Amaro Leite estão situadas as aluviões auríferas mais importantes da região, no Rio do Ouro e Córrego Lambari, objetos de exploração no período colonial.

Mineralizações da área de Amaralina Serão descritas aqui as ocorrências situadas na porção noroeste da área, próximo ao povoado de Amaralina (Fig. 2).

GARIMPO ZÉ AMORIM A ocorrência está situada no canto noroeste da área, cerca de 2 km a leste do povoado de Amaralina (Fig. 2). A mineralização ocorre em zona de cisalhamento de direção NE, onde o ortognaisse tonalítico do Complexo Granito-Gnáissico está transformado em milonito, constituído de porfiroclastos de plagioclásio e de hornblenda, numa matriz de granulação fina, composta de quartzo, epídoto, sericita e clorita. A mineralização ocorre em blocos métricos de quartzo maciço, que contém localmente até 5% de pirita, espalhados numa área de cerca de 50 m², tratando-se, provavelmente, de um veio. Ao microscópio minerográfico, a pirita aparece em grãos envoltos por limonita enquanto o ouro ocorre em grãos de 10 a 20 micra, sob duas formas: livre e associado ao quartzo; ou como inclusões na pirita (Prancha 1, Foto 1).

GARIMPOS FILÓ E SORONGO Na área onde ocorrem as mineralizações em epígrafe predominam rochas da Sequência Mara Rosa, em contato tectônico com ortognais- ses tonalíticos. Observa-se ainda um corpo granítico intru- sivo na Sequência Mara Rosa (Fig. 3).

A Sequência Mara Rosa, encaixante das mineralizações auríferas, pode ser subdividida nas seguintes unidades litoestratigráficas:

- **Epídoto anfibolito:** Nesta unidade predominam anfibólitos de cor verde, granulação fina, com laminação milimétrica a centimétrica. Existem litotipos constituídos essencialmente por anfibólio (hornblenda e tremolita), epídoto e clinopiroxênio, e litotipos onde, além desses minerais, ocorre também plagioclásio em proporção significativa. A composição mineralógica e a presença de grãos de plagioclásio zonados indicam uma origem ortometamórfica para esses anfibólitos.

- **Xistos magnesianos:** São representados por clorita xisto, tremolita xisto e tremolita-clorita xisto que ocorrem sob a forma de uma camada e para os quais é proposta uma origem a partir de lavas ultramáficas.

- **Quartzito grafitoso, anfibolito e magnetita-anfibólio-granada quartzito:** Esta unidade será descrita juntamente com as mineralizações auríferas a ela associadas.

- **Plagioclásio anfibolito:** São rochas de cor verde e cinza-esverdeado, granulação fina a grossa, maciças e incipientemente foliadas, com textura granoblástica e compostas de hornblenda e plagioclásio, com quartzo subordinado. Epídoto pode ou não estar presente, o mesmo ocorrendo em relação ao clinopiroxênio. O plagioclásio está frequentemente zonado indicando o caráter ortoderivado destas unidades, a partir de rochas máficas. Intercalados nos anfibólitos ocorrem biotita-hornblenda gnaisses e magnetita-anfibólio-granada quartzito.

Na porção nordeste da área existem duas frentes de garimpagem, conhecidas como garimpos do Sorongo e do Filó. A estas duas pode-se acrescentar uma terceira, abandonada quando da realização deste trabalho, situada na porção sudoeste da área, junto à estrada que liga Mara Rosa a Amaralina e descrita por Machado *et al.* (1981).

As ocorrências do Filó e do Sorongo estão encaixadas na mesma unidade litoestratigráfica (Fig. 3) e são geologicamente semelhantes. Assim sendo, será descrito somente o garimpo do Filó, onde a exploração é realizada por uma escavação de 30x70 m, com profundidade máxima de 15 m e orientação NE (Fig. 4), concordante com o rumo das unidades litoestratigráficas. Neste local, a unidade portadora da mineralização pode ser dividida em três níveis, descritos a seguir, devendo-se ressaltar que nas espessuras indicadas não foram eliminados os efeitos de dobramentos:

- **"Camada" Grafitosa (10 m):** É constituída por alternâncias centimétricas e métricas de quartzitos puros, quartzitos grafitosos e sericita-quartzo xistos grafitosos. Ao microscópio, o quartzito grafitoso apresenta textura granoblástica orientada e composição à base de quartzo e grafita, com sericita bastante subordinada.

- **Anfibolito (35 m):** São rochas intemperizadas, foliadas, de cor amarelo-ocre a vermelho. No garimpo do Sorongo estas rochas contém intercalações decimétricas de granada-anfibólio quartzitos com sulfetos disseminados.

- **Magnetita-granada-anfibólio quartzito (3 m):** É uma rocha de cor marrom, granulação fina, laminação milimétrica, cuja alteração resulta em material rico em óxidos de manganês. Ao microscópio, mostra textura granoblástica e composição à base de quartzo, granada, tremolita-actinolita e opacos (magnetita e/ou sulfetos). Trata-se, provavelmente, de um *metachert* ferro-manganesífero.

Figura 3 – Contexto geológico dos garimpos Filó e Sorongo (ver localização da área na figura 2)

As mineralizações auríferas explotadas nos garimpos do Filó e do Sorongo são de natureza *stratabound*, compreendendo uma faixa de cerca de 5 m de espessura, englobando parte da “camada” grafitosa e parte do anfibolito (Fig. 4). São de preferência explotados os níveis ricos em lentes de quartzo de segregação, de espessura centimétrica a decimétrica, concordantes com a foliação S_1 , onde se observam ouro livre e algum sulfeto. Amostras de canal do garimpo do Filó apresentaram valores entre 0,5 e 5,0 ppm de ouro (Machado *et al.* 1981).

Para o estudo mineralográfico foram preparadas seções polidas do concentrado de minerais pesados das lentes de

quartzo de segregação, do granada-anfibólio quartzito intercalado nos anfibolitos e do quartzito grafitoso. Neste último, além das lamelas de grafita, estão presentes pequenos grãos de pirita. No granada-anfibólio quartzito, o opaco predominante é a pirrotita, à qual se associam calcopirita, pirita e esfalerita. Alguns dos grãos de calcopirita estão recobertos por uma película de covelita. Os sulfetos aparecem em grãos isolados, xenomorfos, ou em agregados alon-

Figura 4 – Geologia do Garimpo Filó (ver localização na figura 3)

gados e orientados segundo S_1 , indicando que os sulfetos são pré e sin-tectônicos em relação a F_1 (Prancha 1, Foto 2). Na seção de concentrado de minerais pesados a pirita é o sulfeto dominante, ocorrendo em grãos com eventuais inclusões de calcopirita e pirrotita. Calcopirita e esfalerita são sulfetos subordinados e o último apresenta reflexões internas raras e de cor marrom-amarelado que podem conter raras inclusões de pirrotita. Covelita e/ou digenita ocorrem recobrindo os grãos de pirita, calcopirita e esfalerita. Calcocita é rara, ocorrendo associada à covelita. Ocorre ouro livre em grãos de 50 a 250 micra. A paragenese e as texturas indicam que a amostra foi coletada na zona de cementação, onde se observa o enriquecimento supergênico do cobre sob forma sulfetada (Cameron 1961).

Mineralização da área de Amaro Leite Serão descritas aqui as mineralizações da porção nordeste da região estudada (Fig. 2). Na área em epígrafe predominam rochas da Sequência Mara Rosa, circundadas a noroeste por ortognais- ses tonalíticos do Complexo Granito-Gnáissico. Intrusivas máficas, representadas por gabro, hornblendito e diorito, ocorrem em ambas as unidades.

A Sequência Mara Rosa, encaixante das mineralizações estudadas, pode ser dividida nas seguintes unidades litoestratigráficas:

- **Biotita gnaisses:** Na área de ocorrência desta unidade os afloramentos são raros e, geralmente, intemperizados. A rocha predominante parece ser um biotita gnaiss de cor

Prancha 1 – Foto 1 – Garimpo Zé Amorim. Seção polida de veio de quartzo e nicóis paralelos. Os grãos de pirita (P) estão envolvidos por limonita (L) enquanto o ouro (seta, no centro da foto) ocorre associado ao quartzo (Q). **Foto 2 – Garimpo Filó.** Seção polida de granada-anfibólito quartzito e nicóis paralelos. A pirita (P) ocorre em agregados orientados segundo a foliação S_1 , definida pela orientação dos prismas de anfibólio. **Foto 3 – Garimpo Bussum.** Seção polida de concentrado de minerais pesados e nicóis paralelos. Observam-se grãos de pirita (P) e de ouro (Au). **Foto 4 – Garimpo Bussum.** Seção delgada do biotita-quartzo xisto feldspático e nicóis paralelos. Observa-se que a pirita aurífera (opaco) ocorre em agregados orientados segundo a foliação S_1 e, mais raramente, em pequenos grãos subidiomorfos (à esquerda), que truncam a foliação. **Foto 5 – Garimpo Mundinho.** Seção delgada do biotita-muscovita-quartzo xisto e nicóis paralelos. Porfiroblasto de pirita aurífera (opaco) circundado por sombras de pressão (contorno tracejado)

cinza, granulação fina e textura granolepidoblástica, constituído por quartzo, plagioclásio e biotita, com muscovita e epidoto subordinados, interpretando como um metassedimento arcossiano. Ocorrem anfíbolitos como intercalações no biotita gnaíse e, a nordeste de Amaro Leite (Fig. 5), ocorre plagioclásio anfíbolito de cor cinza-esverdeado, foliado, com textura porfírica reliquiar, interpretado como metandesito. Esta rocha tem matriz orientada, de granulação fina, formada por plagioclásio ocasionalmente zonado, hornblenda, quartzo e epidoto. Imersos nesta matriz observam-se fenocristais relictos de plagioclásio de até 5 mm, pré-tectônicos em relação a F_1 , idiomórficos a hipidiomórficos, com geminações segundo as leis da albíta e albíta-periclínio.

• **Epidoto anfíbolitos:** Nesta unidade predominam epidoto anfíbolitos, semelhantes aos que ocorrem na área de Amaralina, interpretados como ortoanfíbolitos. Subordinadamente, ocorrem muscovita-biotita gnaíse, sericita-quartzo xistos grafitosos, mica xistos e magnetita quartzito bandado (formação ferrífera bandada).

• **Muscovita-cianita-quartzo xistos:** São rochas de cor cinza, estrutura foliada e composição à base de quartzo, cianita e muscovita, sendo esta última, geralmente, produto de alteração de cianita.

Figura 5 – Geologia da região de Amaro Leite (modificado de Machado et al. 1981, ver localização da área na figura 2)

GARIMPOS DITINHO, BARROSO E JOÃO LEMOS Nestes três garimpos a rocha encaixante está intensamente intemperizada e, feita esta ressalva, as mineralizações explotadas parecem ser geologicamente semelhantes. As três ocorrências estão encaixadas na mesma unidade litoestratigráfica, onde predomina o biotita gnaíse já descrito.

Nos garimpos em epígrafe as escavações estão, invariavelmente, orientadas a NE, paralelamente ao rumo das unidades litoestratigráficas, que indicam uma natureza *stratabound* para as mineralizações auríferas. O ouro parece ocorrer disseminado nos muscovita-biotita gnaíses intemperizados, assim como em camadas de espessura pluridecimétrica de quartzitos de cor branca e granulação muito fina, contendo algum sulfeto. Ao microscópio, o quartzito apresenta tex-

tura granoblástica, e é constituído quase que somente de quartzo, com opaco e sericita muito subordinados, sendo interpretado como um *metachert*. A observação de uma seção polida desta rocha revela a presença de pirita em pequenos grãos idiomórficos disseminados.

GARIMPO BUSSUM Trata-se de escavação antiga que, segundo Machado et al. (1981), dataria do final do século passado. Quando da realização dos trabalhos de campo, a escavação vinha sendo desentulhada por garimpeiros, numa tentativa de retomar a exploração. A escavação mede cerca de 20x8 m e sua orientação é quase concordante com o rumo das unidades litoestratigráficas, o que sugere uma natureza *stratabound* para a mineralização aurífera (Fig. 6). Neste local, afloram anfíbolito e biotita-quartzo xisto feldspático, em intercalações de espessuras variando entre 0,5 e 3,0 m. O ouro, juntamente com algum sulfeto, ocorre disseminado no xisto.

Figura 6 – Geologia do garimpo Bussum (ver localização nas figuras 2 e 5)

O anfíbolito tem cor verde, granulação fina a média e textura nematoblástica pouco orientada. É constituído essencialmente por hornblenda, com epidoto, clorita e tremolita subordinados, sendo os dois últimos minerais resultantes de alteração da hornblenda.

O biotita-quartzo xisto feldspático tem cor cinza-esverdeado, granulação fina e textura granolepidoblástica. É constituído, essencialmente, de quartzo, biotita e plagioclásio, em proporções variáveis, com clorita e epidoto subordinados. Muscovita, carbonato e opacos podem ou não estar presentes. O plagioclásio, frequentemente zonado, está parcialmente alterado para epidoto e sericita. Estes xistos são interpretados como metatufos intermediários.

Os minerais opacos do biotita-quartzo xisto feldspático foram estudados em seções polidas de rocha e de concentrado de minerais pesados. Na seção polida de concentrado predomina a pirita, com frequentes inclusões ovóides de calcopirita e/ou pirrotita. Ocorre calcopirita também em grãos isolados, assim como ouro livre em grãos com forma irregular, de 10 a 200 microns (Prancha 1, Foto 3). Subordinadamente ocorrem ilmenita, esfalerita e magnetita martitizada. Nas seções delgadas e seções polidas de rocha, obser-

va-se que a pirita ocorre, predominantemente, como agregados orientados segundo S_1 , indicando seu caráter pré e sin-tectônico em relação a F_1 (Prancha 1, Foto 4). Raramente ocorrem grãos idiomórficos de pirita, que parecem representar porfiroblastos pós-tectônicos em relação a F_1 . Análises químicas de concentrados de pirita mostram que este mineral contém ouro, provavelmente sob forma submicroscópica (Tab. 1), o que implicaria que a mineralização aurífera também é pré e sin-tectônica em relação a F_1 .

Tabela 1 – Teores de ouro em concentrados de pirita dos garimpos Bussum e Mundinho (abertura com água-régia a quente e análise por absorção atômica)

Ocorrência	Amostra	Teor de ouro no concentrado de pirita (ppm)
Garimpo Bussum	HAR-57	213,64
	HAR-58	3,74
Garimpo Mundinho	HMR-31	13,79
	HMR-32	43,80

GARIMPO BADE A mineralização aurífera é *strata-bound* e ocorre em uma camada grafitosa intercalada em epidoto anfíbolitos (Fig. 7). Neste local o padrão de afloramentos é determinado por dobras de Fase F_3 , com eixos N45E/15SW.

A camada grafitosa mineralizada é descontínua e apresenta espessura máxima em torno de 5 m. É constituída por alternâncias decimétricas a métricas de sericita-quartzo xisto grafitoso, sericita-quartzo xisto e sericita quartzito. O sericita-quartzo xisto tem cor cinza-escuro, granulação fina e estrutura foliada. A textura é granolepidoblástica e a composição é à base de quartzo, sericita e grafita. Numa seção polida de sericita-quartzo xisto grafitoso observaram-se, além da grafita, grãos disseminados de pirita e de esferalerita.

GARIMPO TRÊS BARRAS No local aflora muscovita-biotita gnaiss de cor cinza-escuro e granulação fina, contendo algum sulfeto. A textura é granolepidoblástica e a composição é à base de quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita e epidoto, com carbonato, opaco e titanita subordinados. Observam-se, ainda, grãos dispersos de plagioclásio, de granulação maior que a do restante da rocha, xenomórficos a hipidiomórficos, alterados para epidoto e sericita. Esta rocha parece representar um metatufu intermediário.

A exploração é realizada por meio de um poço com diâmetro de 5 m e profundidade de cerca de 15 m e sugere que a mineralização tem a forma de uma chaminé (*pipe*). O outro ocorre em material quartzoso maciço e de cor branca, que contém carbonato e algum sulfeto.

Para o estudo minerográfico foi preparada uma seção polida do gnaiss e uma seção polida de concentrado de minerais pesados do corpo mineralizado. No corpo mineralizado, o sulfeto predominante é a pirrotita, com calcopirita subordinada ocorrendo em grãos individuais e em inclusões na pirrotita. No gnaiss observa-se a mesma paragenese, com os sulfetos ocorrendo em agregados alongados segundo a foliação S_1 , indicativos de sua natureza pré a sin-tectônica em relação a F_1 .

Figura 7 – Geologia do Garimpo Badé (ver localização nas figuras 2 e 5)

Mineralizações da área do Rio dos Bois Serão descritas aqui as mineralizações da porção sudoeste da área, situadas próximo ao Rio dos Bois (Fig. 2).

GARIMPOS CHICO DE ASSIS, PEDRO COELHO E ZÉ NUNES As ocorrências em epígrafe estão situadas na porção centro-sul da área, a sudeste do povoado de Marolândia (Fig. 2).

Entre estas três ocorrências, a mais importante é a do garimpo Chico de Assis, onde a escavação mede 100x50 m, com profundidade máxima de 3 m e orientação NE. Neste local, a rocha predominante é um granada-muscovita-biotita-quartzo xisto de cor cinza, granulação fina e textura porfiroblástica, interpretado como um metassedimento grauqueano. Os porfiroblastos são de granada e a matriz é constituída por quartzo, biotita e muscovita, com epidoto, plagioclásio e carbonato subordinados. Intercalam-se níveis decimétricos com contribuição vulcanoclástica, caracterizada por grãos de plagioclásio, xenomórficos a idiomórficos, zonados, pré-tectônicos em relação a F_1 , com geminações complexas.

A principal mineralização explotada era constituída por elúvio contendo fragmentos centimétricos a decimétricos de quartzo sacaroidal. A espessura do elúvio parece ter variado entre 1,5 e 3,0 m, tendo sido totalmente explotado na escavação principal. Uma vez esgotado o elúvio, houve exploração incipiente de bolsões e lentes de quartzo de segregação de espessura decimétrica, intercalados nos xistos e concordantes com S_1 , contendo algum sulfeto. A observação de seções polidas mostra que nos xistos acima referidos o sulfeto predominante é a pirita, com inclusões de pirrotita e ocorrem ainda calcopirita e marcassita subordinadas. Nos bolsões e lentes de quartzo, predomina a pirrotita enquanto pirita e calcopirita são subordinadas.

Nos garimpos Pedro Coelho e Zé Nunes, a principal mineralização explotada foi o elúvio, que contém concreções ferruginosas centimétricas e blocos centimétricos a métricos de quartzo sacaroidal. Nestes garimpos a rocha subjacente está alterada e parece ser representada por muscovita-clorita xistos e mica xistos.

GARIMPOS MUNDINHO E PAULO Nesta área, situada na porção sul da região estudada, foram individualizadas três associações litológicas, descritas a seguir (Fig. 8).

• **Milonitos de composição granítica:** São rochas de cores cinza a rosa, granulação média a grossa e estrutura foliada. A matriz é orientada, de granulação fina, constituída por quartzo, feldspato, muscovita, biotita e epidoto, enquanto os porfiroclastos são de feldspato potássico e de plagioclásio. Mais raramente, observam-se porfiroclastos de quartzo + feldspato com textura granular.

• **Mica xistos:** Os litotipos predominantes são muscovita-quartzo xistos e biotita-muscovita-quartzo xistos, de granulação fina, grafitosos ou não. Associados aos xistos ocorrem, localmente, quartzitos a muscovita e/ou biotita, de granulação fina e bandamento milimétrico a decimétrico, devido a presença de faixas mais micáceas que se alternam com faixas mais quartzosas. Localmente esses quartzitos contêm uma provável contribuição vulcanoclástica evidenciada pela presença de grãos de plagioclásio, pré-tectônicos em relação a F_1 , xenomórficos a hipidiomórficos, com geminações segundo as leis de albita, albita-Carlsbad e albita-periclínio. Ainda associado aos xistos ocorre orto-anfibolito de granulação fina, no qual os cristais de plagioclásio, zonados, estão arranjados segundo uma textura dolerítica reliquiar.

• **Epidosito:** Ocorre numa região muito pobre em afloramentos e trata-se de rocha de cor verde, maciça, granulação muito fina, constituída essencialmente por epidoto e hornblenda, com quartzo bastante subordinado.

A mineralização aurífera ocorre no contato entre uma faixa de mica xistos e uma de milonitos, inserida numa área de 1.000x100 m, com orientação NS, sendo explotada nos garimpos Paulo e Mundinho. A mineralização é geologicamente semelhante nas duas áreas e descreveremos a de Mundinho, onde o grande número de escavações permite uma melhor observação. Neste local, ocorrem faixas de biotita-muscovita-quartzo xisto, intercaladas em milonitos quartzo-feldspáticos, com os quais apresentam contatos bruscos (Fig. 9).

A mineralização aurífera é *stratabound* e está confinada ao biotita-muscovita-quartzo xisto. A principal faixa mineralizada tem espessura variando entre 0,5 e 3,0 m, tendo sido explotada até a profundidade de 18 m (Fig. 9). O mica xisto é rico em bolsões e lentes de quartzo, concordantes com a foliação S_1 e afetados pelas dobras da fase F_2 . Bolsões e lentes quartzosas são atribuídos à segregação metamórfica durante eventos anteriores a F_2 . É possível, no entanto, que parte das lentes quartzosas representem antigos níveis de *chert*, totalmente recrystalizados. Subordinadamente, observam-se algumas barras de quartzo de comprimento decimétrico a métrico atribuídas à fase F_2 . Bolsões, lentes e barras de quartzo são explotados seletivamente e contêm, localmente, ouro visível. O mica xisto é explotado integralmente, quando rico em lentes centimétricas de quartzo de segregação. Esta rocha exibe cor preta, granulação fina e composição à base de quartzo, muscovita, biotita e opacos, sendo interpretada como um metapelito.

Amostras de canal do garimpo Mundinho, em intervalos de 1 m na principal camada mineralizada, apresentaram teores de 0,21 ppm, 0,32 ppm e 1,51 ppm de ouro, sendo a análise realizada por absorção atômica após abertura com água-régia a quente.

Figura 8 - Contexto geológico dos garimpos Mundinho e Paulo (ver localização da área na figura 2)

Figura 9 - Geologia do Garimpo Mundinho (ver localização na figura 8)

A observação de uma seção polida do muscovita-biotita-quartzo xisto mostra que magnetita e pirita são os minerais opacos predominantes; o primeiro ocorre livre de inclusões microscópicas e o segundo pode conter inclusões de calcopirita. Este último mineral é acessório e pode ocorrer também em grãos isolados. A foliação S_2 é bem desenvolvida nesta rocha e a observação de seções delgadas mostra que a pirita é pré-tectônica em relação a F_2 , estando contornada por sombras de pressão bem desenvolvidas (Prancha 1, Foto 5). Análises químicas de concentrados de pirita mostram que este mineral contém ouro, provavelmente sob forma submicroscópica (Tab. 1), indicando que a mineralização é pré-tectônica em relação a F_2 . Estas observações microscópicas estão de acordo com as de escala mesoscópica, onde se nota que lentes de quartzo, concordantes com a foliação S_1 e deformadas durante F_2 , são auríferas.

Conforme o exposto anteriormente, os milonitos podem ser interpretados como granitóides deformados enquanto as faixas xistosas representariam megaxenólitos da Sequência Mara Rosa.

ATIVIDADES DE GARIMPAGEM As atividades de garimpagem são discutidas aqui com o objetivo de obter dados complementares sobre a geologia das mineralizações estudadas. Essa atividade teve início por volta de 1980 e no final de 1983, no auge, trabalhavam na área cerca de 500 pessoas. A partir de 1984, as atividades de garimpagem entraram em decadência, com a paralisação da grande maioria dos garimpos descritos. Isto pode ser creditado à exaustão do minério, no caso das mineralizações eluvionares, quando os garimpos foram abandonados ao atingir o *bedrock*. No caso das mineralizações primárias, o abandono dos garimpos pode ser devido à profundidade das escavações, com o consequente aumento do custo operacional e da frequência de desmoronamentos, assim como à crescente dificuldade na cominuição do minério na granulometria adequada à liberação do ouro. Um outro fator a ser considerado é o da atuação dos processos supergênicos sobre as mineralizações primárias. Estes processos podem fazer com que, na zona oxidada, o ouro seja liberado dos sulfetos, tendo até sua granulometria aumentada em relação ao minério não-oxidado (Boyle 1979). Ainda segundo este autor, pode ocorrer enriquecimento supergênico do ouro na zona de cementação, onde se formam os sulfetos supergênicos. Ambas as situações podem ter ocorrido na região estudada uma vez, que parte do ouro está contida na pirita e, numa das ocorrências estudadas, as escavações atingiram a zona de cementação com enriquecimento supergênico de cobre na forma sulfetada. Vale ressaltar que situação análoga, ou seja, paralisação da exploração uma vez atingido o minério não-oxidado, teria ocorrido em praticamente todas as pequenas minas do *greenstone belt* de Barberton, na África meridional (Anhaeusser 1966).

Os dados disponíveis indicam teores variando entre 0,2 e 5,0 ppm de ouro para as mineralizações estudadas, obtidos em amostras de canal. Como já foi assinalado quando da descrição das mineralizações primárias, a exploração praticada pelos garimpeiros é bastante seletiva, concentrando-se nas zonas ricas em barras, bolsões e lentes de quartzo de segregação, onde os teores seriam mais elevados que os citados acima.

CONCLUSÕES Com base no material mineralizado, as ocorrências foram divididas em: mineralizações secundárias, quando o ouro ocorre em elúvio ou aluvião; e primárias, quando o ouro ocorre no *bedrock*. Com base na morfologia do corpo mineralizado e em suas relações espaciais com as rochas encaixantes, as mineralizações primárias foram subdivididas em: filonianas, quando o ouro ocorre em veio ou chaminé (*pipe*) de quartzo ou quartzo + carbonato, sem condicionamento litoestratigráfico; e *stratabound*, quando, em escala de detalhe, a mineralização está confinada a determinada unidade litoestratigráfica, com o ouro ocorrendo disseminado na rocha e concentrado em barras, bolsões e lentes de quartzo de segregação. Entre as 14 ocorrências descritas, nove são primárias *stratabound*, duas são primárias filonianas e três são secundárias eluvionares.

A maior parte das mineralizações estudadas está encaixada em rochas da Sequência Mara Rosa ou em depósitos eluvionares-aluvionares formados às suas expensas. Nesta sequência destaca-se a faixa que corta diagonalmente a área, com rumo NE e passando por Mara Rosa, à qual está condicionada a maioria das mineralizações primárias, a totalidade das mineralizações secundárias eluvionares e as principais aluviões auríferas da área.

Na Sequência Mara Rosa as mineralizações *stratabound* são largamente predominantes e foi observada apenas uma ocorrência filoniana. Nas faixas anfibolíticas, resultantes do metamorfismo de metavulcânicas máficas, o ouro ocorre em metassedimentos grafitosos interderrames. Nas faixas com predominância de xistos e gnaisses, representando metassedimentos com frequente e abundante contribuição tufácea, o ouro ocorre em *metachert* e em metatufos intermediários.

O Complexo Granito-Gnáissico é, em relação à Sequência Mara Rosa, mais pobre em mineralizações auríferas. Nele foram observadas uma ocorrência filoniana encaixada em ortognaisses tonalíticos e duas ocorrências estratiformes em micaxistos, interpretados como megaxenólitos da Sequência Mara Rosa, englobados por granitóides milonitizados.

As mineralizações secundárias eluvionares ocorrem nas bordas de platôs lateríticos que recobrem rochas da Sequência Mara Rosa.

As mineralizações secundárias aluvionares mais importantes ocorrem nos canais de drenagem, em cujas bacias de captação existem mineralizações auríferas primárias encaixadas na Sequência Mara Rosa.

As mineralizações *stratabound* da área correspondem a um modelo descritivo clássico de mineralização aurífera arqueana (Bache 1982). Para estas mineralizações, é proposto um modelo genético em duas etapas: concentração aurífera singenética, de baixo teor, associada a sulfetos de ferro, cobre e zinco; e remobilização desta concentração provocando enriquecimentos locais em barras, bolsões e lentes de quartzo, desenvolvidos durante os eventos tectonometamórficos que afetaram a sequência encaixante. A proposta de concentração singenética é apoiada pelo controle estratigráfico local, pela natureza sedimentar e/ou tufácea das rochas hospedeiras e pela natureza precoce dos sulfetos que acompanham o ouro. Com efeito, estes sulfetos, às vezes auríferos, são pré-tectônicos e sin-tectônicos em relação a F_1 e, em uma das áreas descritas, pré-tectônicos em relação a F_2 , indicando que a mineralização aurífera é precoce na história deformacional das rochas encaixantes. A partir do contexto vulcano-sedimentar das mineralizações estu-

dadas, propõe-se que a introdução do ouro na bacia de sedimentação se deu por fenômenos exalativos associados ao vulcanismo (Viljoen 1982). A remobilização destas concentrações parece ter-se dado principalmente, mas não exclusivamente, durante a fase F_1 . Este modelo genético é, também, clássico na literatura sobre metalogênese do ouro no Arqueano (Viljoen *op cit.*).

São poucos os dados disponíveis sobre as mineralizações filonianas, podendo-se, no entanto, propor uma origem epigenética e um condicionamento a zonas de falha e/ou de maior complexidade estrutural. Para a mineralização filoniana encaixada na Sequência Mara Rosa, pode-se propor uma origem por remobilização de concentrações auríferas singenéticas contidas nas rochas encaixantes sob ação da tectônica rúptil.

Processos supergênicos podem ter atuado sobre as mineralizações primárias e promovida a liberação do ouro contido nos sulfetos e o aumento de sua granolometria na zona de oxidação. Na zona de cementação, tais processos podem ter levado a um enriquecimento supergênico do metal. Essas possibilidades são sugeridas pela presença de pirita aurífera, existência de enriquecimento supergênico de cobre sulfeto

tado e pelo fato de a maior parte dos garimpos ter sido abandonada uma vez atingida a mineralização não-oxidada.

As mineralizações secundárias eluvionares originaram-se pelo enriquecimento, por processos supergênicos, a partir de concentrações auríferas primárias contidas nas rochas da Sequência Mara Rosa. As mineralizações secundárias aluvionares originaram-se pelo retrabalhamento das mineralizações primárias *stratabound*, das mineralizações primárias filonianas e das mineralizações secundárias eluvionares.

Agradecimentos O autor registra seus agradecimentos: ao DNPM, na pessoa do colega Sevan Naves, diretor do VI Distrito Regional, pelo interesse na realização deste estudo; ao CNPq, pela concessão de auxílio à pesquisa (Processo nº 403.584-83), que viabilizou a realização dos trabalhos de campo; à Coordenadoria de Fomento Mineral da Metago, pela confecção das seções polidas; ao colega Walter H. Schamaltz, cujo apoio tornou possível a realização deste trabalho; aos colegas Maria Abadia da Silva e Daniel Silva da Luz pelas discussões durante a observação de seções delgadas; e à colega Heloísa H.A.B. Silva, pela preparação dos concentrados de minerais pesados e de pirita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANHAEUSSER, C.R. — 1966 — Supergene gold enrichment in the Barberton Mountain Land with particular reference to the Lily Mine. Witwatersrand, *Econ. Geol. Res. Unit, Inform. Circ.*, 29, 16 p.
- BACHE, J.J. — 1982 — Les gisements d'or dans le monde. *Mém. BRGM*, 118, 101 p.
- BOYLE, R.W. — 1979 — The geochemistry of gold and its deposits. *Can. Geol. Surv. Bull.*, 280, 534 p.
- CAMERON, E.N. — 1961 — *Ore microscopy*. New York, John Wiley & Sons. 292 p.
- CAMPOS, E.C.; LACERDA Fº, J.V.; BARRETO Fº, J.A.; COSTA, S.A.G. — 1985 — *Projeto Ouro-Goiás. Relato das atividades desenvolvidas/1984*. Goiânia, MME/DNPM-VI Ds. 175 p.
- DANNI, J.C.M. & FUCK, R.A. — 1981 — Unidades tectono-estratigráficas do embasamento das faixas dobradas na margem ocidental do Cráton do São Francisco. In: SIMPÓSIO SOBRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS, Salvador, 1981. *Anais...* Salvador, SBG, p. 130-139.
- DANNI, J.C.M. & RIBEIRO, C.C. — 1978 — Caracterização estratigráfica da Sequência Vulcano-Sedimentar de Pilar de Goiás e de Guarinos, Goiás. In: CONGR. BRAS. GEOL., 30. Recife, 1978. *Anais...* Recife, SBG, v. 2, p. 582-596.
- MACHADO, E.C.; MORETON, L.C.; PINHEIRO, M.M. — 1980 — *Projeto Porangatu, Etapa I*, Goiânia, DNPM/CPRM. Rel. inédito, v. 1, 75 p.
- MACHADO, E.C. — 1981 — Novas considerações e integração geológica da região de Pilar-Crixás-Mara Rosa-Porangatu. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO CENTRO-OESTE, GEOLOGIA DO PRÉ-CAMBRIANO, 1. Goiânia, 1981. *Atas...* Goiânia, SBG, p. 300-318.
- MACHADO, E.C.; SOUZA, C.J.M.; SILVA, M.A.; BERBERT, C.O. — 1981 — *Projeto Porangatu, Etapa II*. Goiânia, DNPM/CPRM. Rel. inédito, v. 1:253 pp.
- MARINI, O.J.; FUCK, R.A.; DANNI, J.C.M.; DARDENE, M.A.; LOQUÉRCIO, S.O.C.; RAMALHO, R. — 1984 — As faixas de dobramentos Brasília, Uruaçu e Paraguai-Araguaia e o Maciço Mediano de Goiás. In: SCHOBENHAUS, C. et al. ed. *Geologia do Brasil*. Brasília, DNPM, p. 251-355.
- RIBEIRO Fº, W. — 1981 — Reavaliação da geologia da região de Pilar Mara Rosa. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO CENTRO-OESTE, GEOLOGIA DO PRÉ-CAMBRIANO, 1. Goiânia, 1981. *Atas...* Goiânia, SBG, p. 281-296.
- RIBEIRO Fº, W.; COSTA, J.F.G.; ARAÚJO, V.A.; VALENTE, C.R.; MACHADO, E.C.; MATOS, S.H.S.; RODRIGUES, E.; VIVIAN, O.; SÁ, A.M.; LIMA, P.F.C. — 1978 — *Projeto geologia da região de Pilar-Mara Rosa*. Goiânia, DNPM/CPRM. Rel. inédito, v. 1, 150 p.
- SÁ, E.F.J. de & HACKSPACHER, P.C. — 1982 — Revisão sobre análise estrutural, parte I: Conceituação básica e métodos. *Ciências da Terra*, (5):24-36.
- SABÓIA, L.A. — 1979 — Os *greenstone belts* de Crixás e de Goiás, GO. SBG — Núcleo Centro-Oeste, *Bol. Inf.*, 9:44-72.
- SABÓIA, L.A.; TEIXEIRA, N.A.; CASTRO, J.H.G.; TEIXEIRA, A.S. — 1981 — Geologia do *greenstone belt* de Crixás (GO) e suas implicações geotectônicas. In: SIMPÓSIO SOBRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS, Salvador, 1981. *Anais...*, Salvador, SBG, p. 39-50.
- VILJOEN, M.J. — 1982 — The nature and genesis of archaic gold mineralization in Southern Africa. *Rev. Bras. Geoc.*, 12(1-3): 522-530.

MANUSCRITO

Recebido em 28 de novembro de 1985

Revisão aceita em 05 de setembro de 1986

...“os geólogos estão permanentemente diante da tarefa de reconstituir eventos, que aconteceram numa vasta escala e num passado remoto, a partir de vestígios ou produtos desses eventos. Este complexo problema exige a capacidade de raciocinar analogicamente, indutivamente e com imaginação”...

Bradley, H.W. 1963. In: *Fabric of Geology*, pg. 12-23 (Albritton Jr., ed)