



Quelônios do Cretáceo do Brasil
Cretaceous Chelonians from Brazil

Diogo Lins Batista & Ismar de Souza Carvalho

*Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, UFRJ. Av. Brigadeiro Trompowsky, s/n,
CCMN, Ilha do Fundão, 21.914-900. Rio de Janeiro, RJ.
E-mail: linsbatista@yahoo.com.br; ismar@geologia.ufrj.br
Recebido em: 30/03/2007 Aprovado em: 27/07/2007*

O Brasil possui um registro fóssil muito amplo e dentre esta diversidade de animais e vegetais fósseis se encontram os quelônios. Os quelônios habitavam diversas regiões do Brasil: *Podocnemys brasiliensis* Stasche, 1937; *Podocnemys harrisi* Pacheco, 1913; *Bauruemys elegans* (Suarez, 1969) Kischlat, 1994; *Roxochelys wanderleyi* Price, 1953 e *Cambaremys langertoni* França & Langer, 2005 são da Bacia Bauru, Cretáceo Superior, no sudeste do Brasil. *Araripemys barreto* Price, 1973; *Araripemys arturi* Fielding, Martill & Naish, 2005; *Santanachelys gaffneyi* Hirayama, 1998; *Cerarachelys placidoi*

Gaffney, Campos & Hirayama, 2001 e *Brasiliemys josai* Broin, 2000 são representantes da Bacia do Araripe, Cretáceo Inferior, Nordeste do Brasil. *Apodichelys luciano* Price, 1954 é a única representante da Bacia Potiguar, Cretáceo Superior, também do nordeste brasileiro. O exemplar MPEG – 221V foi encontrado na Bacia São Luis-Grajaú e pertence à região norte do Brasil. Existem alguns registros de fósseis de quelônios provenientes da Bacia do Parnaíba, mas apenas uma espécie foi identificada: *Araripemys barreto*.